

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE

ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DU PROTOCOLE ASALEE, CHEZ DES PATIENTS DIABÉTIQUES SUIVIS AU SEIN D'UNE MAISON DE SANTÉ À ROUEN

T. VERNEUIL<sup>1</sup>, A. GILLIBERT<sup>2</sup>, M. LAINE<sup>3</sup>

1. Médecin généraliste Haut-Normand  
2. Département de Biostatistiques, CHU de Rouen  
3. Médecin généraliste Haut-Normand enseignant, Département de Médecine Générale Faculté de Médecine de Rouen

CONTEXTE

La densité médicale des médecins généralistes en France, déjà précaire certaines régions, va continuer de décroître jusqu'en 2020. L'association ASALEE (Action de Santé Libérale En Equipe) permet la délégation de tâches, des médecins généralistes aux infirmières, par des consultations protocolisées pour le dépistage et le suivi. L'éducation thérapeutique a une place prépondérante dans la prise en charge globale centrée patient mais chronophage. Les infirmières formées à cette démarche (Infirmière De Santé Publique, IDSP) effectuent le suivi de patients diabétiques de type 2, de patients à risque cardio-vasculaire, le dépistage et le suivi de patients tabagiques à risque de BPCO, et le dépistage de troubles cognitifs; de nouvelles missions leur seront dédiées dans les années à venir.



OBJECTIFS

Evaluer l'efficacité du protocole ASALEE sur la prise en charge des patients diabétiques dans la maison de santé Saint-Eloi à Rouen.



MÉTHODE

1<sup>ère</sup> partie : étude quantitative rétrospective comparative patients suivis ASALEE/non ASALEE avec recueil de l'HbA1c et du poids de mars 2015 à septembre 2016.  
2<sup>ème</sup> partie : entretien téléphonique pour les patients ASALEE.

RÉSULTATS :

1<sup>ère</sup> partie :  
48 sujets : 15 ASALEE, 33 contrôles

**HbA1c** : Effet non significatif (NS) d'ASALEE ( $p = 0,36$ ) sur l'HbA1c. Estimation de l'effet ASALEE sur l'HbA1c égal à  $-0,24$  [IC95 :  $-0,77$ ;  $+0,28$ ], quelque soit l'ancienneté du diabète.

**Poids** : Tendence non significative d'ASALEE ( $p=0,075$ ) pour la perte de poids. Estimation de l'effet ASALEE sur le poids égal à  $-2,17$  kg [IC95 :  $-4,6$ ;  $+0,23$ ], quelque soit l'ancienneté du diabète.

2<sup>ème</sup> partie :  
Les patients ont consulté l'infirmière en moyenne 2,07 fois.  
On retient :  
Une maladie mieux comprise par les patients  
Des règles hygiéno-diététiques mieux suivies  
Amélioration de l'adhésion thérapeutique  
- 67 % des patients recommandent ces consultations ASALEE à leurs proches.  
- 73 % des patients trouvent ASALEE d'un intérêt de santé publique.



FINANCEMENT

Financée par l'Assurance Maladie, l'association ASALEE permet la rémunération des Infirmières et médecins participant au protocole ASALEE. Rendant ainsi les consultations ASALEE gratuites pour les patients.

Créé il y a 13 ans, ce dispositif collaboratif et novateur est mal connu des professionnels de santé. Ce travail d'équipe potentialise la prise en charge des patients diabétiques ( $- 0,24$  % d'HbA1c et  $- 2,17$  kg, NS). Ce concept est soutenu et financé par la caisse primaire d'assurance maladie. Les maisons de santé pluridisciplinaires permettent avec facilité la mise en place d'ASALEE. Le développement d'ASALEE sur l'ensemble d'un bassin de population semble être une véritable aide aux soins pour les médecins généralistes.

CONCLUSION



— “ —

# ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DU PROTOCOLE ASALEE, CHEZ DES PATIENTS DIABÉTIQUES SUIVIS AU SEIN D'UNE MAISON DE SANTÉ À ROUEN

— ” —



**DATE**  
HEURE

---

**LIEU**

---

**T. VERNEUIL<sup>1</sup>, A. GILLIBERT<sup>2</sup>, M. LAINE<sup>3</sup>**

1. Médecin généraliste Haut-Normand

2. Département de Biostatistiques, CHU de Rouen

3. Médecin généraliste Haut-Normand enseignant, Département de Médecine Générale Faculté de Médecine de Rouen